




Clinica Parioli - Gs&rNS Gruppo Studio &
Ricerca Neuro-Spine . Il rachide e le
patologie neurologiche “Like Spine” .
Guglielmo Berardi, Fabiola Sorpresi
Roma – Bologna - Padova


Ernia del disco : trattamento percutaneo





Ernia del disco : trattamento percutaneo



Ernia del disco : trattamento percutaneo .
Anestesia Locale .




Ernia del disco : trattamento percutaneo .




Frattura vertebrale : trattamento percutaneo con cifoplastica



Frattura vertebrale : trattamento percutaneo con cifoplastica



Frattura vertebrale : trattamento percutaneo con cifoplastica




Ernia del disco : trattamento percutaneo




Ernia del disco : trattamento percutaneo



Ernia del disco : trattamento percutaneo




Ernia del disco : trattamento percutaneo




Ernia del disco : trattamento mini-invasivo







Ernia del disco : trattamento mini-invasivo



Ernia del disco : trattamento mini-invasivo







EMG

EMG Summary Table		Spontaneous							MUAP			Recruitment
Muscolo	Nervo	Radici	IA	Fib	PSW	Fasc	H.F.	Amp	Dur.	PPP	Pattern	
D. Vasto mediale	Femorale	L2-L4	N	None	None	None	None	N	1+	1+	Discrete	
S. Vasto mediale	Femorale	L2-L4	N	None	None	None	None	1+	1+	1+	Reduced	
D. Tibiale anteriore	Peroneo profondo (Fibulare)	L4-L5	N	None	None	None	None	N	1+	1+	Reduced	
S. Tibiale anteriore	Peroneo profondo (Fibulare)	L4-L5	N	N	1+	N	None	1+	1+	1+	Reduced	
D. Estensore lungo dell'alluce	Peroneo profondo (Fibulare)	L5-S1	N	None	None	None	None	1+	1+	1+	Reduced	
S. Estensore lungo dell'alluce	Peroneo profondo (Fibulare)	L5-S1	N	N	1+	N	None	1+	1+	1+	Discrete	
D. Gastrocnemio (testa mediale)	Tibiale	S1-S2	N	None	None	None	None	N	N	N	N	
S. Gastrocnemio (testa mediale)	Tibiale	S1-S2	N	None	None	None	None	N	N	N	N	

Conclusioni: l'esame ad ago ha evidenziato una sofferenza neurogena cronica L4 bilaterale maggiore a sx, L5 bilaterale maggiore a sx dove si registra lieve attività denervativa in fase di organizzazione.

Utile ripetere controllo esame elettromiografico fra 10 giorni.



Ernia del disco : trattamento mini-invasivo

